


Choroby i szkodniki roślin użytkowych, 20 preparatów

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 14.05.2025/DE1

Nr art.: 1143035



to strony z
produktem

745,75 zł brutto

1. Kiła kapusty, plasmodiophora brassicae, z zarodnikami, p.p. 2. Rak ziemniaka, synchytrium endobioticum, zainfekowana bulwa 3. Mączniak rzekomy winorośli, plasmopara viticola, zainfekowane liście z konidiami, p.p. 4. Mączniak rzekomy kapustnych, peronospora parasitica, tkanka żywiciela z konidiami, p.p. 5. Bielik krzyżowych, albugo candida, biała rdza krzyżowych, konidia i stadia płciowe na taszniku 6. Pleśń, rhizopus lub mucor, pleśń, sporangia 7. Torbiel śliwy, exoascus (taphrina) pruni, torbiele śliwy, p.p. z workami 8. Mączniak, erysiphe pannosa, mączniak róży, porażony liść, p.p. 9. Mączniak właściwy winorośli, uncinula necator (oidium tuckeri), porażony liść, p.p. 10. Amerykański mączniak agrestu, sphaerotheca mors uvae, mączniak agrestu, zainfekowany owoc z otoczniami, p.p. 11. Buławinka czerwona, claviceps purpurea, sklerocjum, p.p. 12. Monilia owocowa (zgnilizna), sclerotinia fructigena (monilia albicans), chory owoc z konidiami, p.p. 13. Czerniak klonowy, rhytisma acerinum, smołowata plamistość klonu, p.p. ze sklerotami 14. Parch gruszy, venturia pirinum (fusicladium), konidia, p.p. 15. Głownia guzowata kukurydzy, ustilago zeae, p.p. guzowatej narośli na tkance żywiciela 16. Szara pleśń cebuli, botrytis allii, p.p. 17. Rdza zbożowa, puccinia graminis, uredinia na liściu pszenicy będące przyczyną powstawania czerwonej rdzy, p.p. 18. Rdza zbożowa. Telia na pszenicy będące przyczyną powstawania czarnej rdzy, p.p. 19. Rdza zbożowa, ecja lub pyknidia na liściu berberysu, p.p. 20. Nagość sawiniowa, gymnosporangium sabinae, rdza gruszy, pyknidia na liściu, p.p.

Mikropreparaty są produktami spersonalizowanymi, których nie można zwrócić.